救急医療

救急車

けいれん

発 熱

せき

下痢

おう吐

腹痛

発 疹

誤飲·誤食

けが

やけど

熱中症

くすり

座薬

口・歯

災害時

## 口や歯のけが

- 外傷により歯が折れたときは?
- 外傷によって歯が抜け落ちたときは?
  - ⚠ できるだけ30分以内に歯科を受診し、抜けた歯は持参しましょう。

## <抜けた歯や折れた歯の取り扱い方>

## 乾燥や刺激に弱いので注意!

☆歯の根元は触らない。

☆抜けた歯や折れた歯は乾燥しないように生理食塩水(牛乳も可)に入れて持って行く。

(取扱店:薬局など)

ない場合は、唾液に歯の根元が浸るようにして持って行く。飲み込まずに口の中で保持出来るようであれば、口の中に入れて持って行っても良い。

☆汚れがついている場合、決して拭いたり こすったりせず、水で軽く流す(30 秒以上 は洗わない)生理食塩水(牛乳も可)がある 場合は洗わずそのまま入れても良い。

## 4<75

- 根元は触らない!
- ディッシュなどで 拭かない!
- € 乾燥厳禁!!
- 受傷後30分以内の 処置が大切です!



- ⚠ ぶつけて歯がグラグラするときは?
  - ⚠ 舌や指で触らないようにし、すぐに歯科を受診しましょう。
- ② ぶつけて歯が引っ込んだ(見えている歯の部分が減った。歯の背が低くなった。) ときは?
  - ⚠ 舌や指で触らないようにし、すぐに歯科を受診しましょう。
- ♠ 上唇小帯が切れたときは?
  - ▲ 唾液が血に混じって出血量が多く見えることがあります。止血処置として、 滅菌ガーゼを小さくたたんで、出血しているところに当て20~30分押さ えましょう。

出血部位から湧き出るように血が出ていたらすぐに歯科を受診し、血がにじむように出る程度であれば、自宅で様子を見ましょう。